

# 朝日の メロン台木

共台

- えそ斑点病抵抗性・つる割病レース0、1、2抵抗性・つる割病レース1,2y耐病性品種

## ワンツーツーシャット

【AM192】

- えそ斑点病抵抗性・つる割病レース0、2抵抗性品種

## えそシャット

【AM191】

- つる割病レース0、1、2抵抗性・つる割病レース1,2y耐病性品種

# AM180



## ワンツージャット

- ① つる割病レース0、1、2に抵抗性、1,2yに耐病性
- ② えそ斑点病に抵抗性
- ③ 胚軸が太く接ぎやすい
- ④ 低温伸長性に富む
- ⑤ 共台で、果実の品質を低下させない
- ⑥ 草勢：やや強い

## えそジャット

- ① つる割病レース0、2に抵抗性
- ② えそ斑点病に抵抗性
- ③ 胚軸が太く接ぎやすい
- ④ 共台で、果実の品質を低下させない
- ⑤ 草勢：中程度

## AM180

- ① つる割病レース0、1、2に抵抗性、1,2yに耐病性
- ② 胚軸が太く接ぎやすい
- ③ 低温伸長性に富む
- ④ 共台で、果実の品質を低下させない
- ⑤ 草勢：中程度

品種	フレース0	フレース1	フレース2	フレース1,2y	えそ斑点
ワンツージャット	●	●	●	●	●
えそジャット	●		●		●
AM180	●	●	●	●	

### 栽培の要点

- ① 穂木品種より2～3日早めに播種。挿し接ぎの場合は1週間程度早く。(ただし、これは目安であり、穂木品種の発芽勢により異なる)
- ② 接木後は自根苗と同様に管理する。
- ③ つる割病の汚染度が高い圃場では、土壌消毒と併用する。